

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION DE RHONE-ALPES (Tél. 37-20-56)

(AIN, ARDECHE, DROME, HAUTE-SAVOIE, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ABONNEMENT ANNUEL



15 NF

1er Supplément au bulletin N° 25 d'octobre 1962

10 Octobre 1962

page 39

ARBRES FRUITIERS

INFORMATIONS

CLOQUE DU PECHER et CORYNEUM DES ARBRES FRUITIERS A NOYAU; CHANCRE BACTERIEN DU CERISIER; CHANCRE DU POMMIER - L'efficacité des traitements cupriques d'automne contre ces diverses maladies est nettement démontrée. Ils doivent être appliqués:

- contre les chancres: dès maintenant
- contre cloque et coryneum: à la fin de la chute des feuilles

Sur pêcher on s'assurera préalablement de l'aoûtement des bois. Dans les cas douteux, on remplacera le cuivre par un fongicide de synthèse: zirame, thirame ou captane.

PUCERON LANIGERE DU POMMIER - Le traitement d'automne à raison de 200gr/hl de matière active, très mouillant, peut être appliqué dès maintenant sur les variétés récoltées ou, dans le cas contraire, au fur et à mesure de la récolte. Utiliser un produit à base de H.C.H.

CARENCE EN BORE - Dans les vergers où certains symptômes auraient été attribués par les laboratoires compétents à une carence en bore, on incorporera au sol par un travail superficiel de 20 à 50kg à l'hectare de borate de soude ou l'équivalent d'un autre produit commercial boré approprié. En raison de la fréquence des sécheresses hivernales ou printanières, il est prudent d'effectuer ce travail dès maintenant.

GRANDE CULTURE

INFORMATIONS

CONSERVATION DES TUBERCULES DE POMME DE TERRE - Nous rappelons les principales précautions à respecter pour une bonne conservation:

- ne rentrer que des tubercules bien secs
- ne stocker que des tubercules exempts d'attaques d'insectes ou de maladies
- température des locaux voisine de 10°. Aérer abondamment quand la température extérieure est du même ordre.
- utiliser le plus largement la surface disponible et ménager des cheminées d'aération si l'épaisseur dépasse 20cm.
- saupoudrer les tas de chaux éteinte.

ALTISE ET TENTHREDE DU COLZA - Dès l'apparition des dégâts sur les jeunes feuilles des colzas d'hiver, appliquer un des produits mentionnés à la rubrique "mélégèthe" de la liste des antiparasitaires.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A.PITHIoud

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P.LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L.BOUYX

7344